

gültig ab: 01.01.2027

gültig ab: 01.01.2027		Ertrags- niveau	Stickstoff (N)- Bedarfs- wert	Ertrags- differenz [E]	Zuschläge	Abschläge	Abschläge in Abhängigkeit von Vor- und Zwischen- früchten	Haupt- erntegut- / Neben- erntegut- Verhältnis	Gehalt N im		Gehalt P2O5 im		Trocken- substanz in der Frisch- masse	Nmin erfor- der- lich	Nmin BWE Termin ab		
Kultur					je Ertragsdifferenz				Haupt- erntegut	Neben- erntegut	Haupt- erntegut	Neben- erntegut					
					[kg N/ha u. E]	[kg N/ha u. E]										[kg P2O5 /dt]	[kg P2O5 /dt]

Wintergetreide

Dinkel, Winter-	70	200	10	10	15	0	1	2,1	0,5	0,8	0,3	86	Ja	01.01.
Getreidegemenge-Winter (> 50% Getreide)	65	170	10	10	15	0	0,8	1,38	0,44	0,8	0,3	86	Ja	01.01.
Hartweizen (Durum), Winter-	55	200	10	10	15	0	0,8	2,6	0,5	1	0,3	86	Ja	01.01.
Winterbraugerste 11 % RP	70	160	10	10	15	0	0,7	1,51	0,5	0,8	0,3	86	Ja	01.01.
Wintereremmer/ -einkorn	50	140	10	10	15	0	1	1,81	0,5	0,8	0,3	86	Ja	01.01.
Wintergerste, 12 % RP	70	180	10	10	15	0	0,7	1,65	0,5	0,8	0,3	86	Ja	01.01.
Wintergerste, 13 % RP	70	180	10	10	15	0	0,7	1,79	0,5	0,8	0,3	86	Ja	01.01.
Winterhafer	65	150	10	10	15	0	1,1	1,51	0,5	0,8	0,3	86	Ja	01.01.
Winterroggen, 11 % RP	70	170	10	10	15	0	0,9	1,51	0,5	0,8	0,3	86	Ja	01.01.
Winterroggen, 12 % RP	70	170	10	10	15	0	0,9	1,65	0,5	0,8	0,3	86	Ja	01.01.
Wintertriticale, 12 % RP	70	190	10	10	15	0	0,9	1,65	0,5	0,8	0,3	86	Ja	01.01.
Wintertriticale, 13 % RP	70	190	10	10	15	0	0,9	1,79	0,5	0,8	0,3	86	Ja	01.01.
Winterweizen A/B 12-13 % RP	80	230	10	10	15	0	0,8	1,81	0,5	0,8	0,3	86	Ja	01.01.
Winterweizen A/B 13-14 % RP	80	230	10	10	15	0	0,8	1,96	0,5	0,8	0,3	86	Ja	01.01.
Winterweizen C, bis 12 % RP	80	210	10	10	15	0	0,8	1,81	0,5	0,8	0,3	86	Ja	01.01.
Winterweizen E >16 % RP	80	260	10	10	15	0	0,8	2,41	0,5	0,8	0,3	86	Ja	01.01.
Winterweizen E, 14-16 % RP	80	260	10	10	15	0	0,8	2,11	0,5	0,8	0,3	86	Ja	01.01.

gültig ab: 01.01.2027

gültig ab: 01.01.2027		Ertrags- niveau	Stickstoff (N)- Bedarfs- wert	Ertrags- differenz [E]	Zuschläge	Abschläge	Abschläge in Abhängigkeit von Vor- und Zwischen- früchten	Haupt- erntegut- / Neben- erntegut- Verhältnis	Gehalt N im		Gehalt P2O5 im		Trocken- substanz in der Frisch- masse	Nmin erfor- derlich	Nmin BWE Termin ab
Kultur	je Ertragsdifferenz				Haupt- erntegut	Neben- erntegut			Haupt- erntegut	Neben- erntegut					
	[kg N/ha u. E]										[kg N/ha u. E]	[kg P2O5 /dt]			
	[dt/ha]				[kg N/ha]	[dt/ha]			[kg N/ha]	[1:X]	[kg N/dt]	[kg N/dt]			

Sommergetreide

Amaranth	20	100	5	10	15	0	2,3	2,8	0,6	1,3	0,7	86	Ja	15.03.
Braugerste 10 % RP	50	140	10	10	15	0	0,7	1,38	0,5	0,8	0,3	86	Ja	15.02.
Braugerste 11 % RP	50	140	10	10	15	0	0,7	1,51	0,5	0,8	0,3	86	Ja	15.02.
Buchweizen	20	80	5	10	15	0	2,3	1,65	0,6	0,71	0,73	86	Ja	15.03.
Chia	20	80	5	10	15	0	2,3	2,6	1,2	1,1	0,4	86	Ja	15.03.
Dinkel, Sommer-	70	200	10	10	15	0	1	2,1	0,5	0,8	0,3	86	Ja	15.02.
Emmer	50	140	10	10	15	0	1	1,81	0,5	0,8	0,3	86	Ja	15.02.
Getreidegemenge-Sommer (> 50% Getreide)	45	140	10	10	15	0	0,8	1,38	0,44	0,8	0,3	86	Ja	15.02.
Hafer, 11 % RP	55	130	10	10	15	0	1,1	1,51	0,5	0,8	0,3	86	Ja	15.02.
Hafer, 12 % RP	55	130	10	10	15	0	1,1	1,65	0,5	0,8	0,3	86	Ja	15.02.
Hartweizen (Durum), Sommer-	55	200	10	10	15	0	0,8	2,6	0,5	1	0,3	86	Ja	15.02.
Reismelde Quinoa	20	100	5	10	15	0	2,3	2,6	1,2	1,1	0,4	86	Ja	15.03.
Rispenhirse	30	100	5	10	15	0	1	1,38	0,9	0,8	0,3	86	Ja	15.03.
Sommerfuttergerste 12 % RP	50	140	10	10	15	0	0,8	1,65	0,5	0,8	0,3	86	Ja	15.02.
Sommerfuttergerste 13 % RP	50	140	10	10	15	0	0,8	1,79	0,5	0,8	0,3	86	Ja	15.02.
Sommerroggen	50	140	10	10	15	0	0,9	1,51	0,5	0,8	0,3	86	Ja	15.02.
Sommertriticale	50	160	10	10	15	0	0,9	1,79	0,5	0,8	0,3	86	Ja	15.02.
Sommerweizen	60	200	10	10	15	0	0,8	2,11	0,5	0,8	0,3	86	Ja	15.02.

gültig ab: 01.01.2027

gültig ab: 01.01.2027		Ertrags- niveau	Stickstoff (N)- Bedarfs- wert	Ertrags- differenz [E]	Zuschläge	Abschläge	Abschläge in Abhängigkeit von Vor- und Zwischen- früchten	Haupt- erntegut- / Neben- erntegut- Verhältnis	Gehalt N im		Gehalt P2O5 im		Trocken- substanz in der Frisch- masse	Nmin erfor- derlich	Nmin BWE Termin ab
Kultur	je Ertragsdifferenz				Haupt- erntegut	Neben- erntegut			Haupt- erntegut	Neben- erntegut					
	[kg N/ha u. E]										[kg N/ha u. E]	[kg P2O5 /dt]			
	[dt/ha]				[kg N/ha]	[dt/ha]			[kg N/ha]	[1:X]	[kg N/dt]	[kg N/dt]			

Sommergetreide als Zweitfrucht

Buchweizen Zweitfrucht	15	60				0	2,3	1,65	0,6	0,71	0,73	86	Nein	-
Sommergerste Zweitfrucht	40	100				0	0,8	1,65	0,5	0,8	0,3	86	Nein	-

Mais (Aussaat April/Mai)

Corn-Cob-Mix (CCM)	120	200	10	10	15	0	1	1,01	0,7	0,41	0,2	60	Ja	15.03.
Gemenge Silomais (28 % TS) (>50% Mais)	450	200	50	10	15	0		0,38		0,16		28	Ja	15.03.
Gemenge Silomais (32 % TS) (>50% Mais)	450	200	50	10	15	0		0,43		0,17		32	Ja	15.03.
Gemenge Silomais (35 % TS) (>50% Mais)	450	200	50	10	15	0		0,47		0,18		35	Ja	15.03.
Körnermais 10 % RP	90	200	10	10	15	0	1	1,38	0,9	0,8	0,2	86	Ja	15.03.
Körnermais 11 % RP	90	200	10	10	15	0	1	1,51	0,9	0,8	0,2	86	Ja	15.03.
Silomais (28 % TS)	450	200	50	10	15	0		0,38		0,16		28	Ja	15.03.
Silomais (32 % TS)	450	200	50	10	15	0		0,43		0,17		32	Ja	15.03.
Silomais (35 % TS)	450	200	50	10	15	0		0,47		0,18		35	Ja	15.03.

Hackfrüchte

Frühkartoffeln (RG I, II, III)	400	220	50	10	10	0	0,2	0,35	0,2	0,14	0,04	22	Ja	15.02.
Gehaltsrüben	1000	160	100	10	15	10	0,4	0,18	0,3	0,09	0,08	15	Ja	15.03.
Industriekartoffeln	500	220	50	10	10	0	0,2	0,35	0,2	0,14	0,04	22	Ja	15.03.
Kartoffeln	450	180	50	10	10	0	0,2	0,35	0,2	0,14	0,04	22	Ja	15.03.

gültig ab: 01.01.2027

gültig ab: 01.01.2027		Ertrags- niveau	Stickstoff (N)- Bedarfs- wert	Ertrags- differenz [E]	Zuschläge	Abschläge	Abschläge in Abhängigkeit von Vor- und Zwischen- früchten	Haupt- erntegut- / Neben- erntegut- Verhältnis	Gehalt N im		Gehalt P2O5 im		Trocken- substanz in der Frisch- masse	Nmin erfor- derlich	Nmin BWE Termin ab
Kultur	je Ertragsdifferenz				Haupt- erntegut	Neben- erntegut			Haupt- erntegut	Neben- erntegut					
	[kg N/ha u. E]										[kg N/ha u. E]	[kg P2O5 /dt]			
	[dt/ha]				[kg N/ha]	[dt/ha]			[kg N/ha]	[1:X]	[kg N/dt]	[kg N/dt]			
Kohl-/Steckrübe	900	220	100	20	20	10	0,4	0,26	0,35	0,07	0,06	12	Ja	15.03.	
Masserüben	1000	160	100	10	15	10	0,4	0,14	0,25	0,07	0,06	12	Ja	15.03.	
Pflanzkartoffeln	450	180	50	10	10	0	0,2	0,35	0,2	0,14	0,04	22	Ja	15.03.	
Speisekartoffeln	450	180	50	10	10	0	0,2	0,35	0,2	0,14	0,04	22	Ja	15.03.	
Stärkekartoffeln	450	180	50	10	10	0	0,2	0,35	0,2	0,14	0,04	22	Ja	15.03.	
Zuckerrüben	650	170	100	10	15	10	0,7	0,18	0,4	0,1	0,11	23	Ja	15.02.	

Energie-/Futterpflanzen

Ackerbohne Ganzpflanze	250	20				20	1	0,38		0,14		20	Nein	-
Buchweizen Ganzpflanze	350	160	50	10	15	10	1	0,3		0,11		15	Ja	15.03.
Esparsette Ganzpflanze	200	20				20		0,47		0,13		20	Nein	-
Futtererbse Ganzpflanze	250	20				20		0,38		0,14		20	Nein	-
Futterkohl Ganzpflanze	350	200	50	10	15	10	1	0,48		0,09		20	Ja	15.03.
Futtermisp Ganzpflanze	250	200	50	10	15	10	1	0,45		0,14		15	Ja	15.03.
Gemenge <= 50% Leguminosen, Ganzpflanze	200	120	50	10	15	10		0,53		0,15		20	Ja	15.02.
Gemenge > 50% Leguminosen, Ganzpflanze	250	20				20	1	0,55		0,15		20	Nein	-
Grünroggen Ganzpflanze (BBCH <= 60, ca. Ährenschieben)	350	120	50	10	15	0		0,56		0,23		25	Ja	01.01.
Kenaf Ganzpflanze	250	185	50	10	15	0		0,7		0,3		25	Ja	15.03.
Lupine Ganzpflanze	250	20				20		0,38		0,14		20	Nein	-
Miscanthus Ganzpflanze, (mehrj.) 1. Jahr u. folgende	200	120	50	10	15	0		0,15		0,12		80	Nein	-

gültig ab: 01.01.2027

gültig ab: 01.01.2027	Ertrags- niveau	Stickstoff (N)- Bedarfs- wert	Ertrags- differenz [E]	Zuschläge	Abschläge	Abschläge in Abhängigkeit von Vor- und Zwischen- früchten	Haupt- erntegut- / Neben- erntegut- Verhältnis	Gehalt N im		Gehalt P2O5 im		Trocken- substanz in der Frisch- masse	Nmin erfor- derlich	Nmin BWE Termin ab		
Kultur				je Ertragsdifferenz				Haupt- erntegut	Neben- erntegut	Haupt- erntegut	Neben- erntegut					
				[kg N/ha u. E]	[kg N/ha u. E]										[kg P2O5 /dt]	[kg P2O5 /dt]
				[dt/ha]	[kg N/ha]										[dt/ha]	[kg N/ha]
Miscanthus Ganzpflanze, (mehrj.) letztes Jahr	200	120	50	10	15	10		0,15		0,12		80	Nein	-		
Ölrettich Ganzpflanze	350	160	50	10	15	10	1	0,37		0,12		15	Ja	15.02.		
Phacelia Ganzpflanze	300	150	50	10	15	10	1	0,45		0,09		15	Ja	15.03.		
Rohrglanzgras Ganzpflanze 20% TS, (mehrj.) 1. Jahr u. folgende	500	320				0		0,48		0,16		20	Nein	-		
Rohrglanzgras Ganzpflanze 20% TS, (mehrj.) letztes Jahr	500	320				10		0,48		0,16		20	Nein	-		
Senf Ganzpflanze	350	160	50	10	15	10	1	0,45		0,14		15	Ja	15.03.		
Serradella Ganzpflanze	150	20				20		0,55		0,13		20	Nein	-		
Sida-Virginiamalve Ganzpflanze, (mehrj.) 1. Jahr u. folgende	400	120	50	10	15	0		0,15		0,12		80	Nein	-		
Sida-Virginiamalve Ganzpflanze, (mehrj.) letztes Jahr	400	120	50	10	15	10		0,15		0,12		80	Nein	-		
Silphie Ganzpflanze, (mehrj.) 1. Jahr u. folgende	535	160	50	10	15	0		0,28		0,12		28	Nein	-		
Silphie Ganzpflanze, (mehrj.) letztes Jahr	535	160	50	10	15	10		0,28		0,12		28	Nein	-		
Sommergetreide Ganzpflanze	200	120	50	10	15	0		0,56		0,23		35	Ja	15.02.		
Sommerrübsen Ganzpflanze	250	150	50	10	15	10	1	0,4		0,14		13	Ja	15.03.		
Sonnenblume Ganzpflanze	400	120	50	10	15	0		0,45		0,14		35	Ja	15.03.		
sonstige einjährige Leguminosen Ganzpflanze	250	20				20		0,38		0,14		20	Nein	-		
Staudenknöterich Ganzpflanze, (mehrj.) 1. Jahr u. folgende	715	120	50	10	15	0		0,15		0,12		28	Nein	-		
Staudenknöterich Ganzpflanze, (mehrj.) letztes Jahr	715	120	50	10	15	10		0,15		0,12		28	Nein	-		

veröffentlicht am: 06.08.2026

Seite 5 von 12

gültig ab: 01.01.2027

gültig ab: 01.01.2027	Ertrags- niveau	Stickstoff (N)- Bedarfs- wert	Ertrags- differenz [E]	Zuschläge	Abschläge	Abschläge in Abhängigkeit von Vor- und Zwischen- früchten	Haupt- erntegut- / Neben- erntegut- Verhältnis	Gehalt N im		Gehalt P2O5 im		Trocken- substanz in der Frisch- masse	Nmin erfor- der- lich	Nmin BWE Termin ab		
Kultur				je Ertragsdifferenz				Haupt- erntegut	Neben- erntegut	Haupt- erntegut	Neben- erntegut					
				[kg N/ha u. E]	[kg N/ha u. E]										[kg P2O5 /dt]	[kg P2O5 /dt]
				[dt/ha]	[kg N/ha]										[dt/ha]	[kg N/ha]
Sudangras Ganzpflanze	470	160	50	10	15	0		0,3		0,09		30	Ja	15.03.		
Szarvarsi-/Riesenweizengras Ganzpflanze, (mehrj.) 1. Jahr u. folgende	550	200	50	10	15	0		0,27		0,11		28	Nein	-		
Szarvarsi-/Riesenweizengras Ganzpflanze, (mehrj.) letztes Jahr	550	200	50	10	15	10		0,27		0,11		28	Nein	-		
Topinambur (Kraut), (mehrj.) 1. Jahr u. folgende	125	90	50	10	15	0		0,28		0,08		22	Nein	-		
Topinambur (Kraut), (mehrj.) letztes Jahr	125	90	50	10	15	10		0,28		0,08		22	Nein	-		
Wicke Ganzpflanze	200	20				20	1	0,38		0,14		20	Nein	-		
Wickroggen Ganzpflanze	350	150	50	10	15	20		0,52		0,14		20	Ja	01.01.		
Wintergetreide Ganzpflanze (Gerste)	350	180	50	10	15	0		0,56		0,23		35	Ja	01.01.		
Wintergetreide Ganzpflanze (Gerste) / Leguminosen Gemenge (>50% Getreide)	350	180	50	10	15	0		0,56		0,23		35	Ja	01.01.		
Wintergetreide Ganzpflanze (Roggen) / Leguminosen Gemenge (>50% Getreide)	350	170	50	10	15	0		0,56		0,23		35	Ja	01.01.		
Wintergetreide Ganzpflanze (Roggen, BBCH > 60 ca. Teigreife)	350	170	50	10	15	0		0,56		0,23		35	Ja	01.01.		
Wintergetreide Ganzpflanze (Triticale)	350	190	50	10	15	0		0,56		0,23		35	Ja	01.01.		
Wintergetreide Ganzpflanze (Triticale) / Leguminosen Gemenge (>50% Getreide)	350	190	50	10	15	0		0,56		0,23		35	Ja	01.01.		

gültig ab: 01.01.2027

gültig ab: 01.01.2027		Ertrags-niveau	Stickstoff (N)-Bedarfs-wert	Ertrags-differenz [E]	Zuschläge	Abschläge	Abschläge in Abhängigkeit von Vor- und Zwischenfrüchten	Haupt-erntegut- / Neben-erntegut-Verhältnis	Gehalt N im		Gehalt P2O5 im		Trocken-substanz in der Frisch-masse	Nmin erforder-lich	Nmin BWE Termin ab
Kultur	je Ertragsdifferenz				Haupt-erntegut	Neben-erntegut			Haupt-erntegut	Neben-erntegut					
	[kg N/ha u. E]										[kg N/ha u. E]	[kg P2O5 /dt]			
	[dt/ha]				[kg N/ha]	[dt/ha]			[kg N/ha]	[1:X]	[kg N/dt]	[kg N/dt]			
Wintergetreide Ganzpflanze (Weizen)		350	210	50	10	15	0		0,56		0,23		35	Ja	01.01.
Wintergetreide Ganzpflanze (Weizen) / Leguminosen Gemenge (>50% Getreide)		350	210	50	10	15	0		0,56		0,23		35	Ja	01.01.
Winterrübsen Ganzpflanze		350	200	50	10	15	10	1	0,45		0,14		13	Ja	01.01.
Zuckerhirse (Sorghum) Ganzpflanze		450	160	50	10	15	0		0,31		0,11		26	Ja	15.03.

Energie-/Futterpflanzen als Zweitfrucht (Aussaat 1.6.-15.7.)

Feldfutter 2 Schnitte (ohne Leguminosen) [TM]	70	140				10		2,65		0,8		100	Nein	-
Feldfutter 2 Schnitte (<= 50 % Leguminosen) [TM]	70	100				10		2,9		0,7		100	Nein	-
Feldfutter 2 Schnitte (> 50 % Leguminosen) [TM]	60	20				20		2,9		0,7		100	Nein	-
Mais als Zweitfrucht 28%TS	300	100				0		0,38		0,16		28	Nein	-
Sommergetreide GPS Zweitfrucht 35%TS	180	80				0		0,56		0,23		35	Nein	-
Sonnenblume GPS Zweitfrucht 18%TS	390	80				0		0,36		0,1		18	Nein	-
Sudangras GPS Zweitfrucht 28%TS	300	100				0		0,27		0,08		28	Nein	-
Zuckerhirse GPS Zweitfrucht 25%TS	340	100				0		0,32		0,15		20	Nein	-

ÖL-/ Faserpflanzen

Brennessel (Fasernutzung)	400	248	50	10	15	10		0,62		0,17			Ja	15.02.
---------------------------	-----	-----	----	----	----	----	--	------	--	------	--	--	----	--------

gültig ab: 01.01.2027

gültig ab: 01.01.2027	Ertrags- niveau	Stickstoff (N)- Bedarfs- wert	Ertrags- differenz [E]	Zuschläge	Abschläge	Abschläge in Abhängigkeit von Vor- und Zwischen- früchten	Haupt- erntegut- / Neben- erntegut- Verhältnis	Gehalt N im		Gehalt P2O5 im		Trocken- substanz in der Frish- masse	Nmin erfor- der- lich	Nmin BWE Termin ab
Kultur				je Ertragsdifferenz				Haupt- erntegut	Neben- erntegut	Haupt- erntegut	Neben- erntegut			
				[kg N/ha u. E]	[kg N/ha u. E]									
				[dt/ha]	[kg N/ha]			[dt/ha]	[kg N/ha]	[1:X]	[kg N/dt]			
Faserhanf Ganzpflanze	150	160	50	10	15	10		0,4		0,3		40	Ja	15.03.
Faserhanf, Herbstansaat Ganzpflanze	150	100				10		0,4		0,3		40	Nein	-
Flachs (Faserlein) Ganzpflanze	80	100	10	10	15	10		1		0,64		86	Ja	15.02.
Hanf Körner	20	160	5	10	15	10	7,5	3,25	0,5	2,43	0,3	91	Ja	15.03.
Krambe (Ölkrambe)	15	100	5	10	15	10	1,5	3,19	0,7	1,46	0,4	91	Ja	15.02.
Leindotter	20	80	5	10	15	10	1,5	4,28	0,8	1,56	0,3	91	Ja	15.02.
Mariendisteln	18	80	5	10	15	10	1,5	3,3	0,53	1,8	0,2		Ja	15.02.
Öllein	20	100	5	10	15	10	1,5	3,5	0,53	1,2	0,2	91	Ja	15.03.
Ölrettich	25	160	5	10	15	10	1,7	3,3	0,8	1,8	0,5	86	Ja	15.02.
Raps, 23 % RP, Winter-	40	200	5	10	15	10	1,7	3,35	0,7	1,8	0,4	91	Ja	01.01.
Raps, Sommer-	25	150	5	10	15	10	1,7	3,35	0,7	1,8	0,4	91	Ja	15.02.
Senf	20	100	5	10	15	10	1,5	5,08	0,7	1,77	0,4	91	Ja	15.03.
Sommerrübsen	25	150	5	10	15	10	1,7	3,3	0,8	1,8	0,5	86	Ja	15.03.
Sonnenblume	30	120	5	10	15	10	2	2,91	1	1,6	0,9	91	Ja	15.03.
Winterrübsen	35	200	5	10	15	10	1,7	3,35	0,8	1,8	0,4	86	Ja	01.01.

Körnerleguminosen (Drusch)

Erbsen/Bohngengemenge 50:50	38	20				10	1	3,85	1,5	1,15	0,3	86	Nein	-
Esparssette	15	20				10	1	3,6	1,5	1,1	0,3	86	Nein	-
Gemenge Leguminosen/Getreide (> 50% Leguminosen)	65	20				10	1	2,7	1,1	1	0,3	86	Nein	-
Linsen	15	20				10	1	4,35	1,5	1,1	0,3	86	Nein	-

gültig ab: 01.01.2027

gültig ab: 01.01.2027		Ertrags- niveau	Stickstoff (N)- Bedarfs- wert	Ertrags- differenz [E]	Zuschläge	Abschläge	Abschläge in Abhängigkeit von Vor- und Zwischen- früchten	Haupt- erntegut- / Neben- erntegut- Verhältnis	Gehalt N im		Gehalt P2O5 im		Trocken- substanz in der Frisch- masse	Nmin erfor- derlich	Nmin BWE Termin ab	
Kultur	je Ertragsdifferenz				Haupt- erntegut	Neben- erntegut			Haupt- erntegut	Neben- erntegut						
	[kg N/ha u. E]										[kg N/ha u. E]	[kg P2O5 /dt]				[kg P2O5 /dt]
	[dt/ha]										[kg N/ha]	[dt/ha]				[kg N/ha]
Lupine blau	30	20					10	1	4,48	1,5	1,02	0,3	86	Nein	-	
Sojabohne	20	20					10	1	4,4	1,5	1,5	0,3	86	Nein	-	
Sommer-Ackerbohne	35	20					10	1	4,1	1,5	1,2	0,3	86	Nein	-	
Sommer-Erbse	35	20					10	1	3,6	1,5	1,1	0,3	86	Nein	-	
Wicke	15	20					10	1	3,6	1,5	1,1	0,3	86	Nein	-	
Winter-Ackerbohne	35	20					10	1	4,1	1,5	1,2	0,3	86	Nein	-	
Winter-Erbse	40	20					10	1	3,6	1,5	1,1	0,3	86	Nein	-	

Vermehrung

Grassamenvermehrung (Nachnutzung)	180	80				10	1	0,43	0,43		0,13	15	Nein	-
Grassamenvermehrung (Samenschnitt)	20	170				10	8	2,2	1,5	0,7	0,35	86	Nein	-
Hybridsommerrapsvermehrung	15	150				10	1,7	3,35	0,7	1,8	0,4	91	Ja	15.02.
Klee-/Luzernevermehrung (Samenschnitt)	12	20				20	8	5,5	1,5	1,46	0,3	91	Nein	-
Phaceliavermehrung	6	150				10	8	2,2	1,5	0,7	0,35	91	Ja	15.03.
Rübensamenvermehrung	21	80				10	6	1,8	0,7	1,2	0,4	86	Ja	15.03.
Serradellavermehrung	12	20				20	3	3,5	1,5	1,46	0,3	91	Nein	-
Wildkräutervermehrung (Leguminosen)	5	20				20	8	2,8	1,5	1,5	0,45	91	Ja	15.03.
Wildkräutervermehrung (Nicht-Leguminosen)	5	120				10	8	2,8	1,5	1,5	0,35	91	Ja	15.03.
Winterrapsvermehrung	24	200				10	1,7	3,35	0,7	1,8	0,4	91	Ja	01.01.

gültig ab: 01.01.2027

gültig ab: 01.01.2027		Ertrags- niveau	Stickstoff (N)- Bedarfs- wert	Ertrags- differenz [E]	Zuschläge	Abschläge	Abschläge in Abhängigkeit von Vor- und Zwischen- früchten	Haupt- erntegut- / Neben- erntegut- Verhältnis	Gehalt N im		Gehalt P2O5 im		Trocken- substanz in der Frisch- masse	Nmin erfor- derlich	Nmin BWE Termin ab
Kultur	je Ertragsdifferenz				Haupt- erntegut	Neben- erntegut			Haupt- erntegut	Neben- erntegut					
	[kg N/ha u. E]										[kg N/ha u. E]	[kg P2O5 /dt]			
	[dt/ha]				[kg N/ha]	[dt/ha]			[kg N/ha u. E]	[kg N/ha u. E]	[kg N/ha]	[1:X]			
Winterrübsenvermehrung	21	200				10	6	1,8	0,7	1,2	0,4	91	Ja	01.01.	

andere Handelsgewächse

Mohn (Schlafmohn, Backmohn)	15	100				10	3	3,23	0,7	1,92	0,4		Ja	15.02.
Tabak (lufttrocken)	23	115				10	1	3	2	0,4	0,3		Ja	15.03.

Gründung im Hauptfruchtanbau

Gründung (Leguminosenanteil <=50%) im Hauptfruchtanbau (941)	0	60				10	1	0,35	0,35		0,11	20	Ja	15.03.
Gründung (Leguminosenanteil >50%) im Hauptfruchtanbau (941)	0	20				20	1	0,46	0,46		0,13	20	Nein	-

Gründungszwischenfrüchte

Gründungszwischenfrucht <= 50% Leguminosen	300	60				0	1	0,43	0,43		0,13	15	Nein	-
Gründungszwischenfrucht >50-75% Leguminosen	300	0				0	1	0,43	0,43		0,13	15	Nein	-
Gründungszwischenfrucht >75% Leguminosen	300	0				10	1	0,43	0,43		0,13	15	Nein	-

Futterzwischenfrüchte

Futterzwischenfrucht <= 50% Leguminosen	180	80				0	1	0,43	0,43		0,13	15	Nein	-
Futterzwischenfrucht >50-75% Leguminosen	180	0				0	1	0,43	0,43		0,13	15	Nein	-
Futterzwischenfrucht >75% Leguminosen	180	0				10	1	0,43	0,43		0,13	15	Nein	-

veröffentlicht am: 06.08.2026

Seite 10 von 12

gültig ab: 01.01.2027

Kultur	Ertrags- niveau	Stickstoff (N)- Bedarfs- wert	Ertrags- differenz [E]	Zuschläge	Abschläge	Abschläge in Abhängigkeit von Vor- und Zwischen- früchten	Haupt- erntegut- / Neben- erntegut- Verhältnis	Gehalt N im		Gehalt P2O5 im		Trocken- substanz in der Frisch- masse	Nmin erfor- derlich	Nmin BWE Termin ab
				je Ertragsdifferenz				Haupt- erntegut	Neben- erntegut	Haupt- erntegut	Neben- erntegut			
				[kg N/ha u. E]	[kg N/ha u. E]					[kg P2O5 /dt]	[kg P2O5 /dt]			
	[dt/ha]	[kg N/ha]	[dt/ha]			[kg N/ha]	[1:X]	[kg N/dt]	[kg N/dt]			[%]		

Blühstreifen, -fläche

Blühstreifen Ansaatjahr mehrjährig mit Leguminosen	0	0				20		0		0			Nein	-
Blühstreifen Ansaatjahr mehrjährig ohne Leguminosen	0	60				20		0		0			Nein	-
Blühstreifen einjährig mit Leguminosen	0	0				20		0		0			Nein	-
Blühstreifen einjährig ohne Düngung mit Leguminosen	0	0				20		0		0			Nein	-
Blühstreifen einjährig ohne Düngung ohne Leguminosen	0	0				10		0		0			Nein	-
Blühstreifen einjährig ohne Leguminosen	0	60				10		0		0			Nein	-
Blühstreifen mehrjährig ab 2. Standjahr mit Leguminosen	0	0				20		0		0			Nein	-
Blühstreifen mehrjährig ab 2. Standjahr ohne Leguminosen	0	0				20		0		0			Nein	-

unproduktive Flächen (nicht zur LF)

Brache Begrün. mit Leguminosen ab Frühj.	0	0				20		0		0			Nein	-
Brache Begrün. mit Leguminosen ab Herbst	0	0				20		0		0			Nein	-
Brache Begrün. ohne Leguminosen ab Frühj.	0	0				10		0		0			Nein	-
Brache Begrün. ohne Leguminosen ab Herbst	0	0				10		0		0			Nein	-
Dauerbrache	0	0				20		0		0			Nein	-

gültig ab: 01.01.2027

gültig ab: 01.01.2027	Ertrags-niveau	Stickstoff (N)-Bedarfs-wert	Ertrags-differenz [E]	Zuschläge	Abschläge	Abschläge in Abhängigkeit von Vor- und Zwischen-früchten	Haupt-erntegut- / Neben-erntegut-Verhältnis	Gehalt N im		Gehalt P2O5 im		Trocken-substanz in der Frisch-masse	Nmin erforder-lich	Nmin BWE Termin ab		
Kultur				je Ertragsdifferenz				Haupt-erntegut	Neben-erntegut	Haupt-erntegut	Neben-erntegut					
				[kg N/ha u. E]	[kg N/ha u. E]										[kg P2O5 /dt]	[kg P2O5 /dt]
Stilllegung 20 Jahre	0	0				20		0		0			Nein	-		